

# HPV PAPILOMA VIRUS HUMAIN

5.4-ITMU06301

## ○ Epidémiologie des HPV

Les papillomavirus humains (HPV) sont transmis par contact cutané-muqueux directs (rapports sexuels) ou indirects (surfaces ou objets contaminés). Les infections régressent spontanément dans plus de 90% des cas à 2 ans. C'est la persistance d'une infection à HPV HR oncogène qui entraîne un risque élevé de cancer de la zone muqueuse.

**Les HPV sont responsables de cancers du col de l'utérus (CCU). En France, près de 3000 nouveaux cas de cancers invasifs sont détectés et plus de 1000 décès constatés chaque année. La présence d'HPV est retrouvée dans presque 100% des cancers du col de l'utérus, 90% des cancers anaux et 70% des cancers du vagin.**

Environ 200 génotypes sont décrits, avec des pouvoirs oncogènes différents.

## ○ Place du test HPV

La détection du génome viral HPV est remboursé dans le cadre du dépistage du CCU. **La réalisation d'un test HPV-HR en dépistage primaire chez les femmes de 30 à 65 ans sur prélèvement cervical remplace l'examen cytologique.** Cf stratégie de dépistage HAS 2019 (ci jointe)

## ○ Types de prélèvements

Prélèvement cervical Cytobrosse :

Réalisé par un professionnel de santé, le prélèvement sera techniqué au laboratoire, selon les recommandations HAS. La cytologie réflexe sera ensuite orientée par le laboratoire directement en anatomopathologie (selon les résultats du dépistage).

**Les prélèvements pourront être réalisés par le biologiste médical sur les sites suivants : Vannes Ténéio, Auray Kériolet, Sarzeau et Muzillac.**

Autoprélèvement vaginal

L'HAS recommande **l'auto-prélèvement vaginal** pour améliorer le dépistage chez les femmes non dépistées ou insuffisamment dépistées.

En effet, un certain nombre de femmes échappent au suivi gynécologique classique avec prélèvement cervico-utérin pour des raisons d'acceptabilité et de praticabilité multiples. Le dispositif d'**auto-prélèvement** que nous mettons à disposition des femmes **dans l'ensemble de nos laboratoires** est validé pour la recherche des HPV-HR avec le test Seegene HPV. Pratique et très simple d'utilisation, il se compose d'un écouvillon sec à recapuchonner une fois le prélèvement réalisé.



**Le prescripteur pourra noter sur l'ordonnance : HPV par autoprélèvement**

Si le dépistage PCR est positif, la cytologie devra être prélevée dans un second temps sur cytobrosse, pour être adressée au laboratoire d'anatomopathologie.

